

ПРОВЕДЕНИЕ БИОПСИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ПРОСТАТЫ)

Врач направил Вас на обследование с подозрением на возможный рак предстательной железы. Исследование проводится под местной анестезией через стенку прямой кишки с помощью специального датчика. Кусочки ткани берутся из разных участков предстательной железы (всего 12 кусочков) и отсылаются в гистологическую лабораторию на исследование, где патолог исследует полученные препараты при помощи микроскопа. Результаты исследования будут готовы в течение 2-4 недель.

Во время процедуры Вы можете почувствовать некоторый дискомфорт в области нижней части живота и прямой кишки. Во время проведения биопсии Вы также можете услышать щелкающие звуки, которые издает аппарат для взятия кусочков ткани на исследование. Для проведения процедуры Вас попросят лечь на левый бок с согнутыми в коленях ногами, либо процедура будет проводиться в гинекологической позе на соответствующем смотровом кресле, поэтому рекомендуем Вам удобно одеться, собираясь на процедуру.

ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ

- Накануне исследования **начните курс антибиотиков** и примите первые 2 таблетки Ципринола (всего 1000 мг), по возможности во время или после еды.
- Вместе с антибиотиками рекомендуем принимать и **пробиотики**.
- Утром в день исследования необходимо **очистить кишечник**, при необходимости используйте специальные средства, например 1 тюбик **Melilax** (заранее купить в аптеке).
- Курс антибиотика **следует продолжать. Необходимо** принимать таблетки Ципринола по 1 таблетке (500 мг) x 2 раза в сутки (всего следует принять 10 таблеток).

ВНИМАНИЕ! Проконсультируйтесь с врачом или медсестрой (телефон 5885 1814), если:

- Вы принимаете лекарственные препараты для разжижения крови (Мареван, Плавикс, Эликвис, Хьертемагил, Аспирин и другие)
- у Вас имеется повышенная чувствительность к лекарствам
- у Вас возникли симптомы, сходные с простудными заболеваниями

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ:

- нельзя поднимать тяжести (~10 кг) в течение 1-2 дней;
- рекомендуется по возможности меньше сидеть;
- в тот же день нельзя принимать ванну, париться в бане или посещать бассейн;
- может отмечаться небольшое кровотечение из прямой кишки, а также кровь в моче;
- сперма может иметь примесь крови и быть коричневатого цвета еще в течение 1-3 месяцев.

ВНИМАНИЕ! Просим незамедлительно обратиться в отделение неотложной помощи, если у Вас после процедуры:

- внезапно поднялась температура (≥ 38 °C);
- возникла задержка мочи;
- появилось сильное кровотечение из прямой кишки или мочевого пузыря;
- возникла сильная боль внизу живота, при которой не помогают обезболивающие препараты.

Если по какой-либо причине Вы не сможете прийти на исследование в заранее оговоренное время, пожалуйста, сообщите нам об этом по телефону 5885 1814.