

Potilaan suostumus gastrokopian tekemiseen

Hyvä potilas!

Terveydentilasi täsmällisempää tutkimista varten pyydämme suostumustasi gastrokopian suorittamiseksi.

Yleistietoa

Gastroskopia on ruoansulatuskanavan yläosan tutkimus, jonka aikana lääkäri saa kuvan ruokatorven, mahalaukun ja pohjukaissuolen tilasta. Gastroskopian aikana viedään suun kautta mahalaukkuun elastinen instrumentti, gastroskooppi. Tutkimus kestää noin 10 minuuttia – se voi pidentyä, mikäli samalla otetaan myös biopsia tai tehdään hoitotoimenpiteitä.

Tutkimuksen avulla voidaan

- selvittää oireiden syitä (ylävatsakipu, pahoinvointi, oksentaminen, nielemishäiriöt)
- löytää sairausperäisiä muutoksia ruokatorvessa, mahalaukussa tai pohjukaissuolessa (verenvuoto, haava, kasvaimet)
- ottaa koepaloja (biopsia) diagnoosin täsmentämiseksi.

Tutkimukseen valmistautuminen

- Ennen tutkimusta ei saa syödä tai juoda 12 tuntiin.
- Ota silmälasit ja hammasproteesit pois ennen tutkimusta.
- Kerro ennen tutkimusta lääkärille, mikäli käytät verta ohentavia lääkkeitä.
- Paikalle suositellaan tultavaksi saattajan kanssa, joka huolehtii turvallisesta kotiinpääsystä tutkimuksen jälkeen.

Tutkimuksen suorittaminen

- Sinulle voidaan tarjota paikallispuudutusta, eli kipulääkettä, joka puuduttaa suun ja kurkun. Ennen sitä tarkistetaan mahdolliset allergiat.
- Tutkimuksen aikana makaat kylkiasennossa. Koeta levätä mahdollisimman rauhallisesti ja rentoutua.
- Endoskoopin suojaksi asennetaan hampaiden ja ikenien väliin muovinen suukappale.
- Tutkimus ei ole kipeä, mutta on epämiellyttävä sen aiheuttaman oksennus- ja yskärefleksin vuoksi.
- Suuhun kertyvää sylkeä ei saisi yrittää niellä, vaan antaa sen valua ulos.
- Endoskopian avulla johdetaan mahalaukkuun ilmaa, jotta se venyisi ja limakalvo olisi paremmin nähtävillä lääkärille. Ilma vatsassa tekee täyden vatsan tunteen. Tutkimuksen jälkeen saattaa sisään johdettu ilma poistua suun kautta.

Tutkimuksen jälkeen

- Paikallispuudutuksen jälkeen ei saa syödä tai juoda noin 30 minuuttiin.
- Biopsian ottamisen jälkeen on vältettävä syömistä tai juomista verenvuodon vaaran vuoksi.
- Mikäli toimenpiteen aikana on annettu rauhoittavia lääkkeitä, ei samana päivänä saa ajaa autolla, koska lääkeaine vähentää reaktionopeutta.

Komplikaatiot

- Gastroskopiasta aiheutuu harvoin komplikaatioita. Koepalojen ottamisen jälkeen saattaa esiintyä verenvuotoa.
- Saattaa myös esiintyä ruokatorven tai mahalaukun seinän perforaatiota, eli puhkeamia. Tätä esiintyy harvoin, mutta se vaatii kirurgista hoitoa.
- Jos sinulla esiintyy tutkimuksen jälkeen kuumetta, kovaa vatsakipua tai verenvuotoa, käänny välittömästi hoitavan lääkärin tai ensiapuklinikan puoleen.

Täten vakuutan, että olen lukenut tämän asiakirjan ja ymmärtänyt sen sisällön täydellisesti. Olen tietoinen tutkimuksen perusolemuksesta ja mahdollisista vaaroista.

Olen ennen suostumukseni antamista saanut minua tyydyttävän vastauksen kaikkiin kysymyksiini tähän toimenpiteeseen ja siihen liittyviin vaaroihin ja komplikaatioihin liittyen.

Mikäli et pääse tulemaan tutkimukseen sovittuna aikana, ilmoita siitä mahdollisimman pian lääkärillesi.

(Potilaan tai hänen edustajansa nimi ja allekirjoitus)

(Päivämäärä, kellonaika)